

# Carolus.

Srednje pozna vsestransko uporabna jedilna sorta z atraktivnimi rdečimi očesci, primerna za konvencionalno in ekološko pridelavo.

- Rumeni, ovalni in izenačeni gomolji s plitvimi očesci in rumenim mesom.
- Primerna za cvrtje, z visoko vsebnostjo suhe snovi.
- Zelo odporna na plesen listov in gomoljev, odporna na krompirjev rak (1) in ima dobre pridelke.



## Značilnosti

### Uporaba

vsestranska uporaba,  
za svežo porabo

### Značilnosti rastline


Zgodnost srednje pozna  
Začetni razvoj dober  
Barva cveta vijoličen

### Značilnosti gomoljev

Barva kože rumena/delno rdeča  
Barva mesa rumena  
Oblika gomolja ovalni  
Število gomoljev veliko  
Velikost gomoljev srednja  
Izenačenost gomoljev izenačeni  
Globina očes zelo plitva  
Vsebnost suhe snovi 21,2%  
Kuharski tip BC  
Poškodbe pri izkopu precej občutljiva  
Črnenje gomoljev precej občutljiva  
Dormanca dolga

### Odpornost

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Nematode RO 1-4         | dovzetna          |
| Nematode RO 2-3         | dovzetna          |
| Nematode PA 2           | dovzetna          |
| Nematode PA 3           | dovzetna          |
| Y <sup>n</sup> -virus   | imuna             |
| Y <sup>ntn</sup> -virus | precej odporna    |
| Krastavost              | občutljiva        |
| Prašna krastavost       | precej občutljiva |
| Plesen na gomoljih      | imuna             |
| Plesen na listih        | imuna             |
| Tobakov mozaik          | malo občutljiva   |
| Krompirjev rak 1        | odporna           |
| Metribuzin              | precej občutljiva |



## Priprava



### Gnojenje<sup>1</sup>

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Dušik:  | standardni odmerek +10% |
| Fosfor: | standardni odmerek      |
| Kalij:  | standardni odmerek +15% |

### Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Kratek temperaturni šok ali nakaljevanje ugodno vplivata na pridelek. Carolus ima počasen razvoj, zato ga moramo saditi v dovolj ogreto zemljo.

### Razdalja

28/35: 20 cm (66,500 rastlin/ha)

35/55: 27-28 cm (49,000 rastlin/ha)

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Gojenje

### Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

### Fungicidi

Carolus je odporen na krompirjevo plesen na listih in gomoljih, zato preventivni ukrepi niso potrebni.



## Spravilo & Skladiščenje



### Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne. Carolus je precej občutljiv na mehanske poškodbe in na črnenje gomoljev.

### Skladiščenje

Carolus ima dolgo dormanco in je primeren za dolgo skladiščenje pri 5°C, pri skladiščenju za industrijsko predelavo temperatura ne sme biti nižja od 7°C. Za dobro dormanco je priporočljivo relativno hitro ohlajanje do priporočene temperature.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.