

Constance.

Srednje zgodnja sorta za pečenje in svežo porabo, s svetlo rumeno kožico in svetlo rumenim mesom.

- Gomolji so ovalno okrogli, z plitvimi očesci in izenačene oblike.
- Odlična za kuhanje in pečenje, s srednje veliko vsebnostjo suhe snovi.
- Dobro prenaša temperaturne strese, odporna je na viruse in primerna za pridelavo v vseh tipih tal.



Značilnosti

Uporaba

vsestranska uporaba,
za svežo porabo

Značilnosti rastline


Zgodnost srednje zgodnja
Začetni razvoj dober
Barva cveta bel

Značilnosti gomoljev

Barva kožice rumena
Barva mesa svetlo rumena
Oblika gomolja okroglo ovalni
Število gomoljev srednje
Velikost gomoljev srednja
Izenačenost gomoljev izenačeni
Globina očes plitva
Vsebnost suhe snovi 19,7%
Kuharski tip AB
Poškodbe pri izkopu občutljiva
Črnenje gomoljev ni občutljiva
Dormanca srednja

Odpornost

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Nematode RO 1-4 | dovzetna |
| Nematode RO 2-3 | dovzetna |
| Nematode PA 2 | dovzetna |
| Nematode PA 3 | dovzetna |
| Y ⁿ -virus | precej odporna |
| Y ^{ntn} -virus | precej odporna |
| Krastavost | malo občutljiva |
| Prašna krastavost | zelo občutljiva |
| Plesen na gomoljih | občutljiva |
| Plesen na listih | precej občutljiva |
| Tobakov mozaik | precej občutljiva |
| Metribuzin | malo občutljiva |



Priprava



Gnojenje¹

| | |
|---------|-------------------------|
| Dušik: | standardni odmerek +15% |
| Fosfor: | standardni odmerek |
| Kalij: | standardni odmerek +15% |

Priprava semena

Kaliče odstranimo največ enkrat. Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev.

Razdalja

| | |
|--------|----------------------------|
| 28/35: | 27 cm (50,000 rastlin/ha). |
| 35/55: | 36 cm (37,000 rastlin/ha). |

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Gojenje

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči manjše razbarvanje listov, vendar ne zmanjša pridelka.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Constance precej občutljiva na krompirjevo plesen.



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj dva tedna, ker je Constance občutljiva na mehanske poškodbe, ni pa občutljiva na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Constance ima povprečno dormanco in je primerna za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev) pri temperaturi 4,5°C. Priporoča se uporaba rastnih inhibitorjev v plinski obliki.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.