

Manitou.

Pozna jedilna sorta s privlačno rdečo kožico, velikimi pridelki, za pripravo praženega in ocvrtega krompirja. S strani Društva praženega krompirja večkrat izbran kot najboljša sorta.

- Veliki ovalni podolgovati gomolji s plitvimi očesci ter svetlo rumenim mesom.
- Primerna za kuhanje, praženje in cvrtje. S strani Društva praženega krompirja je bil že večkrat izbran kot najboljša sorta.
- Dobro prenaša temperaturne strese, odporna na krastavost, nematode PCN (RO2&4) ter krompirjev rak.



Značilnosti

Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline

Zgodnost	pozna
Začetni razvoj	počasen
Barva cveta	vijoličen

Značilnosti gomoljev

Barva kožice	rdeča
Barva mesa	svetlo rumena
Oblika gomolja	podolgovato ovalni
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	zelo plitva
Vsebnost suhe snovi	19,7%
Kuharski tip	B
Poškodbe pri izkopu	precej občutljiva
Črnenje gomoljev	ni občutljiva
Dormanca	srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	odporna
Nematode PA 2	dovzetna
Nematode PA 3	dovzetna
Y ⁿ -virus	malo občutljiva
Y ^{ntn} -virus	precej odporna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	malo občutljiva
Plesen na gomoljih	precej občutljiva
Plesen na listih	precej občutljiva
Tobakov mozaik	precej odporna
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	precej občutljiva



Priprava



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek +10%

Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev.

Razdalja

28/35: 25 cm (54,000 rastlin/ha).

35/55: 30 cm (45,000 rastlin/ha).

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Gojenje

Pleveli

Ne uporabljajte metribuzina (Sencor), saj povzroči hudo listno reakcijo in občutno zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Manitou precej občutljiv na krompirjevo plesen.



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Zaradi občutljivosti na mehanske poškodbe počakamo z izkopom tri tedne po uničenju cime. Na črnenje gomoljev Manitou ni občutljiv.

Skladiščenje

Manitou ima povprečno dormanco in je primeren za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev) pri temperaturi 5°C.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.