


Rudolph.

Pozna sorta s privlačno rdečo kožico, dobro prenaša toplotne strese in daje velike pridelke.

- Veliki izenačeni ovalno okrogli gomolji, s temno rdečo kožico, plitvimi očesci in belim mesom.
- Primerna za kuhanje, s primerno vsebnostjo suhe snovi in je vsestransko uporabna.
- Odporna na temperaturne strese, na krompirjev rak(1) in primerna za daljše skladiščenje.



Značilnosti

Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline

Zgodnost	pozna
Začetni razvoj	počasen
Barva cveta	svetlo vijoličen

Značilnosti gomoljev

Barva kožice	rdeča
Barva mesa	bela
Oblika gomolja	okroglo ovalni
Število gomoljev	malo
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	plitva
Vsebnost suhe snovi	20%
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	zelo dolga

Odpornost

Nematode RO 1-4	dovzetna
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA 2	dovzetna
Nematode PA 3	dovzetna
Y ⁿ -virus	precej občutljiva
Y ^{ntn} -virus	precej odporna
Krastavost	občutljiva
Prašna krastavost	precej odporna
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	precej občutljiva
Tobakov mozaik	precej odporna
Krompirjev rak 1	odporna
Krompirjev rak 2	odporna na okuženih področjih
Krompirjev rak 6	odporna na okuženih področjih
Metribuzin	precej občutljiva



Priprava



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek -5%, boljši učinek v split aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek +10%

Priprava semena

Pred sajenjem priporočamo kratek temperaturni šok. Pravilna nakalitev z odstranitvijo apikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev. Optimalna je enkratna nakalitev.

Razdalja

28/35: 20 cm (67,000 rastlin/ha).
35/55: 25 cm (54,000 rastlin/ha).

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Gojenje

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči nekaj listnega razbarvanja lahko zmanjša pridelek.

Fungicidi

Dosledno, preventivno škropljenje proti krompirjevi plesni je nujno, ker je Rudolph precej občutljiv.



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne, ker je Rudolph občutljiv na mehanske poškodbe in nekoliko občutljiv na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Rudolph ima dolgo dormanco in je primeren za dolgotrajno skladiščenje.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.