


Srednje zgodnja, vsestransko uporabna jedilna sorta z rdečo kožico, primerna za ekološko pridelavo.

- Precej veliki, ovalno podolgovati gomolji s temno rdečo kožico, plitvimi očesi in rumeno barvo mesa.
- Precej dobra sorta za svežo porabo, kuhanje in industrijsko predelavo.
- Odporna na plesen, tako na listih, kot tudi na gomoljih, ter na nematode PCN (RO1&4,2&3).



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba
za svežo porabo

Značilnosti rastline


Zgodnost srednje zgodnja
Začetni razvoj dober
Barva cveta svetlo vijoličen

Značilnosti gomoljev

Barva kože rdeča
Barva mesa rumena
Oblika gomolja ovalno podolgovati
Število gomoljev srednje
Velikost gomoljev srednja
Izenačenost gomoljev izenačeni
Globina očes plitva
Vsebnost suhe snov 21%
Podvodna teža 385
Kuharski tip AB
Poškodbe pri izkopu občutljiva
Črnenje gomoljev ni občutljiva
Dormanca srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	odporna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	imuna
Yntn-virus	imuna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	precej odporna
Plesen na gomoljih	precej odporna
Plesen na listih	imuna
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	precej občutljiva



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme

Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek+10%
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek+ 20%

Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Ne sadimo direktno iz hladilnice. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

Razdalja

28/35: 20 cm (67,000 plants/ha).
35/55: 25 cm (54,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.



Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči manjše razbarvanje listov in včasih nekoliko zmanjša pridelek.

Fungicidi

Alouette je odporna na krompirjevo plesen na listih in gomoljih, preventivni ukrepi niso potrebni.

Gojenje



Spravilo & skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne. Alouette je občutljiv na mehanske poškodbe, ni pa občutljiv na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Alouette ima povprečno dormanco in je primeren za srednje dolgo skladiščenje.