

Srednje zgodnja jedilna sorta, ki tudi v ekstremnih klimatskih pogojih daje zelo velike pridelke.

- Veliki ovalni in izenačeni gomolji z rumeno kožico in svetlo rumenim mesom.
- Primerna za kuhanje, z visokimi pridelki, nizko vsebnostjo suhe snovi in se srednje dolgo skladišči.
- Dobra prenaša temperaturne strese, odporna je na viruse in ima velike zanesljive pridelke.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline


Zgodnost	srednje zgodnja
Začetni razvoj	zmeren
Barva cveta	bela

Značilnosti gomoljev

Barva kože	rumena
Barva mesa	svetlo rumena
Oblika gomolja	ovalni
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	zelo plitva
Vsebnost suhe snov	17%
Podvodna teža	310
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	precej občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	imuna
Yntn-virus	imuna
Krastavost	precej občutljiva
Prašna krastavost	zelo občutljiva
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	precej občutljiva
Tobakov mozaik	precej odporna
Krompirjev rak 1	odporna
Krompirjev rak 2	nekoliko občutljiva
Krompirjev rak 6	nekoliko občutljiva
Metribuzin	dokaj občutljiva



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija

T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24

I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek -10%, boljši učinek v split aplikaciji, drugi odmerek, ko se prične tvoriti gomolji.
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

Prirpava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

Razdalja

28/35: 27 cm (50,000 plants/ha).

35/55: 30 cm (45,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Arizona precej občutljiva na krompirjevo plesen.

Gojenje



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Arizona nekoliko občutljiva na črnenje gomoljev in precej občutljiva na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Arizona ima povprečno dormanco in je primerna za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev) pri temperaturi 5°C.