

Arrow.

Zgodnja jedilna sorta s privlačno gladko kožico, primerna za pridelavo v različnih tipih tal.

- Veliki, svetli, izenačeni gomolji podolgovato ovalne oblike, s plitvimi očesi in krem belim mesom.
- Primerna za kuhanje, z nizko vsebnostjo suhe snovi.
- Odporna na krastavost, in dobro prenaša temperaturne strese.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline


Zgodnost	zgodnja
Začetni razvoj	zmeren
Barva cveta	bela

Značilnosti gomoljev

Barva kože	rumena
Barva mesa	krem bela
Oblika gomolja	ovalno podolgovati
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	zelo plitva
Vsebnost suhe snov	18%
Podvodna teža	325
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	precej občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	kratka

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	precej občutljiva
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	precej občutljiva
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	občutljiva
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	dokaj občutljiva



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija

T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24

I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme

Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek-10%
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

Prirpava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

Razdalja

28/35: 20 cm (67,000 plants/ha).

35/55: 25 cm (54,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.



Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Arrow občutljiv na krompirjevo plesen.

Gojenje



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Arrow nekoliko občutljiv na črnenje gomoljev in precej občutljiv na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Arrow ima kratko dormanco in je primeren za kratkotrajno skladiščenje, uporabo rastnih inhibitorjev v obliki plina odsvetujemo.