

Srednje pozna vsestransko uporabna jedilna sorta z atraktivnimi rdečimi očesci, primerna za konvencionalno ali ekološko pridelavo.

- Rumeni, ovalni in izenačeni gomolji s plitvimi rdečimi očesci in rumenim mesom.
- Primerna za cvrtje, z visoko vsebnostjo suhe snovi.
- Zelo odporna na plesen listov in gomoljev, odporna na krompirjev rak (1) in ima dobre pridelke.



## Lastnosti

### Uporaba

vsestranska uporaba  
za svežo porabo

### Značilnosti rastline


Zgodnost srednje pozna  
Začetni razvoj dober  
Barva cveta vijoličen

### Značilnosti gomoljev

Barva kože rumena, delno rdeče  
obarvana  
Barva mesa rumena  
Oblika gomolja ovalni  
Število gomoljev veliko  
Velikost gomoljev srednja  
Izenačenost gomoljev izenačeni  
Globina očes zelo plitva  
Vsebnost suhe snovi 21%  
Podvodna teža 390  
Kuharski tip BC  
Poškodbe pri izkopu precej občutljiva  
Črnenje gomoljev precej občutljiva  
Dormanca dolga

### Odpornost

Nematode RO 1-4	dovzetna
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	imuna
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	občutljiva
Prašna krastavost	precej občutljiva
Plesen na gomoljih	imuna
Plesen na listih	imuna
Tobakov mozaik	malo občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	dokaj občutljiva



### Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija  
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24  
I [www.interseme.si](http://www.interseme.si)

## Gojenje Priprava

### Gnojenje<sup>1</sup>

Dušik:	standardni odmerek-10%
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek + 10%

### Prirpava semena

Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Kratek toplotni šok ali nakalitev daje najboljše rezultate pri sorti Carolus. Sadimo, ko je zemlja dovolj ogreta, saj ima Carolus počasnejši začetni razvoj.

### Razdalja

28/35: 25 cm (54,000 plants/ha).

35/55: 30 cm (45,000 plants/ha).



<sup>1</sup>: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Gojenje

### Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

### Fungicidi

Carolus je odporna sorta na krompirjevo plesen na listih in gomoljih, preventivni ukrepi niso potrebni.



## Spravilo & Skladiščenje

### Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj dva tedna, ker je Carolus nekoliko občutljiv na črnenje gomoljev in na mehanske poškodbe.

### Skladiščenje

Carolus ima dolgo dormanco in je primeren za daljše skladiščenje pri 5°C, za predelavo se ne skladišči pod 7°C. Za dolgo dormanco se priporoča hitra ohladitev na priporočeno temperaturo.

