


Casablanca.

Gojenje Opis 1 / 2

Zgodnja sorta s privlačno belo kožo, uporabna za različne namene, odličnega okusa, daje velike pridelke zgodnjega krompirja.

- Okroglo ovalni izenačeni gomolji, z belo kožico, plitvimi očesi in in krem belim mesom.
- Odlična sorta z visoko vsebnostjo suhe snovi, primerna za svežo porabo, kuhanje, pečenje in cvrtje.
- Dobro prenaša temperaturne strese, odporna je na krastavost in črno nogo in je enostavna za pridelavo.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba
za svežo porabo

Značilnosti rastline


Zgodnost	zgodnja
Začetni razvoj	dober
Barva cveta	bel

Značilnosti gomoljev

Barva kože	bela
Barva mesa	krem bela
Oblika gomolja	okroglo ovalni
Število gomoljev	veliko
Velikost gomoljev	srednja
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	plitva
Vsebnost suhe snov	20%
Podvodna teža	325
Kuharski tip	BC
Poškodbe pri izkopu	malo občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	kratka

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna
Nematode RO 2-3	odporna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	precej odporna
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	malo občutljiva
Plesen na gomoljih	občutljiva
Plesen na listih	občutljiva
Tobakov mozaik	malo občutljiva
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	dokaj občutljiva



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme

Gojenje Priprava

Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

Prirpava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

Razdalja

28/35: 25 cm (54,000 plants/ha).

35/55: 30 cm (45,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.



Gojenje

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, še posebno proti krompirjevi plesni.



Spravilo & Skladiščenje

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Casablanca nekoliko občutljiva na črnenje gomoljev in na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Casablanca ima kratko dormanco in je primerna za kratkotrajno skladiščenje.

