


Zgodnja sorta, z majhnimi podolgovatimi gomolji in rdečo kožico, solatna jedilna sorta odličnega okusa.

- Veliko število majhnih, podolgovatih gomoljev, temno rdeče kože in rumenega mesa.
- Primerna predvsem za kuhanje, s precejšno vsebnostjo suhe snovi, odlično aromo in kuharskimi lastnostmi.
- Dobro uspeva na lažjih tleh in je precej odporna na Erwinijo in viruse.



Lastnosti

Uporaba

za svežo porabo

Značilnosti rastline

Zgodnost	zgodnja
Začetni razvoj	dober
Barva cveta	svetlo vijoličen


Značilnosti gomoljev

Barva kože	rdeča
Barva mesa	rumena
Oblika gomolja	podolgovati
Število gomoljev	zelo veliko
Velikost gomoljev	majhna
Izenačenost gomoljev	neizenačeni
Globina očes	zelo plitva
Vsebnost suhe snov	20%
Podvodna teža	370
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	malo občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	delno odporna*
Nematode RO 2-3	dovzetna*
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	precej odporna
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	precej občutljiva
Prašna krastavost	malo občutljiva
Plesen na gomoljih	precej občutljiva
Plesen na listih	občutljiva
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Metribuzin	dokaj občutljiva

*: Rezultati označeni z * so plod raziskav Agrico Research in še niso uradno objavljeni



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme

Gojenje Priprava

Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek+10%
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

Prirpava semena

Kaliče lahko odstranimo največ enkrat. Ceriso lahko sadimo direktno iz hladilnice.

Razdalja

30/50: 20 cm (67,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravilen odmerek gnojil.



Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Cerisa občutljiva na krompirjevo plesen.

Gojenje



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj dva tedna, ker je Cerisa precej občutljiva na črnenje gomoljev in na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Cerisa ima povprečno dormanco in je primerna za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev) pri temperaturi 5°C.