

Constance.

Srednje zgodnja sorta za pečenje in svežo porabo, s svetlo rumeno kožo in svetlo rumenim mesom.

- Gomolji so ovalno okrogli, s plitvimi očesci in izenačene oblike.
- Odlična za kuhanje in pečenje, s srednje veliko vsebnostjo suhe snovi.
- Dobro prenaša temperaturne strese in je odporna na viruse.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba
za svežo porabo

Značilnosti rastline

Zgodnost	srednje zgodnja
Začetni razvoj	dober
Barva cveta	bel


Značilnosti gomoljev

Barva kože	rumena
Barva mesa	svetlo rumena
Oblika gomolja	okroglo ovalni
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	srednja
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	plitva
Vsebnost suhe snov	20%
Podvodna teža	360
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	občutljiva
Črnenje gomoljev	ni občutljiva
Dormanca	srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	dovzeta*
Nematode RO 2-3	dovzeta*
Nematode PA2	dovzeta*
Nematode PA3	dovzeta*
Yn-virus	precej odporna
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	malo občutljiva
Prašna krastavost	zelo občutljiva
Plesen na gomoljih	občutljiva
Plesen na listih	precej občutljiva
Tobakov mozaik	precej občutljiva
Metribuzin	malo občutljiva

*: Rezultati označeni z * so plod raziskav Agrico Research in še niso uradno objavljeni



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek+15%
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

Prirpava semena

Kaliče lahko odstranimo največ enkrat. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev.

Razdalja

28/35: 27 cm (50,000 plants/ha).

35/55: 36 cm (37,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči manjše razbarvanje listov, vendar ne zmanjša pridelka.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Constance precej občutljiva na krompirjevo plesen.

Gojenje



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj dva tedna, ker je Constance občutljiva na mehanske poškodbe, ni pa občutljiva na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Constance ima povprečno dormanco in je primeren za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev) pri temperaturi 4,5°C. Priporoča se uporaba rastnih inhibitorjev v plinski obliki.