

Zelo zgodnja jedilna sorta s privlačno kožico, odlično prenaša toplotne strese, dobro je odporna na viruse, daje dober zgoden pridelek.

- Veliki izenačeni svetlo rumeni gomolji s čvrsto kožo, relativno plitvimi očesci in svetlo rumenim mesom.
- Primerna za kuhanje z dobrimi kuharskimi lastnostmi.
- Odlično prenaša temperaturne strese, odporna na viruse in primerna za krajše skladiščenje.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline

Zgodnost	zelo zgodnja
Začetni razvoj	dober
Barva cveta	bel


Značilnosti gomoljev

Barva kože	rumena
Barva mesa	svetlo rumena
Oblika gomolja	okroglo ovalni
Število gomoljev	srednje
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	srednje plitva
Vsebnost suhe snov	18%
Podvodna teža	320
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	malo občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	srednja

Odpornost

Nematode RO 1-4	odporna*
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	imuna
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	precej občutljiva
Prašna krastavost	zelo občutljiva
Plesen na gomoljih	precej občutljiva
Plesen na listih	zelo občutljiva
Tobakov mozaik	precej odporna
Krompirjev rak 1	odporna
Metribuzin	malo občutljiva

*: Rezultati označeni z * so plod raziskav Agrico Research in še niso uradno objavljeni



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme

Gojenje Priprava



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek +10%, boljši učinek v split aplikaciji, drugi odmerek, ko se prične tvoriti gomolji.
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek

Prirpava semena

Kaliče lahko odstranimo največ enkrat. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev. Optimalna je enkratna nakalitev.

Razdalja

28/35: 22 cm (60,500 plants/ha).

35/55: 27 cm (50,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravilen odmerek gnojil.

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči manjše razbarvanje listov in ne zmanjša pridelek.

Fungicidi

Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je Riviera zelo občutljiva na krompirjevo plesen.

Gojenje



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Riviera le nekoliko občutljiva na črnenje gomoljev in na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Riviera ima povprečno dormanco in je primerna za srednje dolgo skladiščenje (6 mesecev).