

Rudolph.

Pozna sorta s privlačno rdečo kožico, dobro prenaša toplotne strese in daje zelo velike pridelke.

- Veliki izenačeni ovalno okrogli gomolji, s temno rdečo kožico, s plitvimi očesci in belim mesom.
- Primeren za kuhanje, s primerno vsebnostjo suhe snovi in je vsestransko uporabna.
- Odporna na temperaturne strese, na krompirjev rak(1) in primerna za daljše skladiščenje.



Lastnosti

Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline


Zgodnost	pozna
Začetni razvoj	počasen
Barva cveta	svetlo vijoličen

Značilnosti gomoljev

Barva kože	rdeča
Barva mesa	bela
Oblika gomolja	okroglo ovalni
Število gomoljev	malo
Velikost gomoljev	velika
Izenačenost gomoljev	izenačeni
Globina očes	plitva
Vsebnost suhe snov	20%
Podvodna teža	365
Kuharski tip	AB
Poškodbe pri izkopu	občutljiva
Črnenje gomoljev	malo občutljiva
Dormanca	zelo dolga

Odpornost

Nematode RO 1-4	dovzetna
Nematode RO 2-3	dovzetna
Nematode PA2	dovzetna
Nematode PA3	dovzetna
Yn-virus	precej občutljiva
Yntn-virus	precej odporna
Krastavost	občutljiva
Prašna krastavost	precej odporna
Plesen na gomoljih	malo občutljiva
Plesen na listih	precej občutljiva
Tobakov mozaik	precej odporna
Krompirjev rak 1	odporna
Krompirjev rak 2	odporna na okuženih področjih
Krompirjev rak 6	odporna na okuženih področjih
Metribuzin	precej občutljiva



Interseme

Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana / Slovenija

T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24

I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

interseme

Gojenje Priprava



Gnojenje¹

Dušik:	standardni odmerek +5%, boljši učinek v split aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.
Fosfor:	standardni odmerek
Kalij:	standardni odmerek+ 10%

Prirpava semena

Pred sajenjem priporočamo kratek temperaturni šok. Pravilna nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek gomoljev. Optimalna je enkratna nakalitev.

Razdalja

28/35: 20 cm (67,000 plants/ha).

35/55: 25 cm (54,000 plants/ha).

¹: Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči nekaj listnega razbarvanja in včasih zmanjša pridelek.

Fungicidi

Dosledno, preventivno škropljenje proti krompirjevi plesni je nujno, ker je Rudolph precej občutljiv.

Gojenje



Spravilo & Skladiščenje



Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo tri tedne, ker je Rudolph občutljiv na mehanske poškodbe in le nekoliko občutljiv na črnenje gomoljev.

Skladiščenje

Rudolph ima dolgo dormanco in je primeren za dolgotrajno skladiščenje.