

Pozna sorta z belim mesom, primerna za industrijsko predelavo in pripravo pomfrita.

- ✓ Nizka vsebnost sladkorjev
- ✓ Kakovosten za cvrtje
- ✓ Dobro se skladišči



Splošni podatki

- Žlahtnitelj: Lantmännen Seed B.V.
- Žlahtniteljske pravice: 31-12-2049
- Sejanec: -
- Križanec: SW 08-1984

Tržni namen

- Okusno



Značilnosti rastline in gomoljev

Zgodnost	pozna / 5
Barva kaličev	rdeče vijolični
Barva cveta	svetlo vijoličen
Tvorba jagod	nič / 4
Začetni razvoj listov	srednje hiter / 6
Pokrovnost	zelo dobra / 8
Razpoznavnost bolezni (viroz) na listih	lahka / 7
Čvrstost rastline	čvrst / 7,5

Barva mesa	bela / 4,5
Barva kože	rumena
Izgled kože	srednje slaba / 5
Velikost gomoljev	zelo veliki / 8
Oblika gomolja	podolgovato ovalni
Izenačenost oblike	izenačeni / 6,5
Nastavek gomoljev	srednje / 6
Izenačenost velikosti gomoljev	zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca)	zelo dolga / 8
Metribuzin	malo občutljiv / 7,5
Bentazon	- / -
Etilen	5% manj gomoljev / 4
Carvonsko olje	15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast	nekoliko občutljiv / 6,5
Pokanje gomoljev	malo občutljiv / 7
Črnenje gomoljev	nekoliko občutljiv / 6,5
Poškodbe ob izkopu	občutljiv / 5

Podvodna teža	433
Vsebnost suhe snovi	23,3%
Porazdelitev suhe snovi	dobra / 7
Vsebnost TGA	6,8

Uporabnost za čips	dober / 7
Uporabnost za cvrtje	odličen / 8
Kuharski tip	zelo moknat / C
Sprememba barve po lupljenju	nekoliko občutljiv / 6
Razbarvanje po kuhanju	nekoliko občutljiv / 6,5

**Z nami boste res
"imeli krompir"**

Interseme je opise sort pripravil z vso skrbnostjo in po svojih najboljših močeh zagotovil dejanske in resnične opise sort. Upoštevajte možnost, da se informacije lahko spremenijo. Interseme ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti. Interseme v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki izhaja iz ali je lahko povezana z informacijami iz teh opisov.

Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode RO 1-4	Odporen na polju / 8
Nematode RO 2-3	- / -
Nematode PA 2	- / -
Nematode PA 3	- / -

Plesen na listih	občutljiv / 5
Plesen na gomoljih	malo občutljiv / 6,5

Navadna krastavost	zelo občutljiv / 4,5
Prašnata krastavost	malo občutljiv / 7
Fuzarioze	malo občutljiv / 7
Črna noga	- / -
Črna pikavost gomoljev	malo do neobčutljiv / 8
Tobakov mozaik	malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov	- / -
Virus - A	- / -
Virus - X	- / -
Yn-virus	zelo občutljiv / 4,5
Yntn-virus	malo do neobčutljiv / 8,5

Krompirjev rak 1	- / -
Krompirjev rak 6	- / -
Krompirjev rak 18	- / -

Gnojenje ¹

Dušik:	standardni odmerek.
Fosfor:	standardni odmerek.
Kalij:	standardni odmerek + 25%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev. Odstranjevanje aplikalnih kaličev pri višjih temperaturah je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev.

Sadilna razdalja ¹

28/35 mm:	22-25 cm (55.000 rastlin/ha)
35/55 mm:	30-34 cm (42.000 rastlin/ha)
50/55 mm:	37-39 cm (35.000 rastlin/ha)

Pleveli

Uporaba metribuzina (Sencor) po vzniku ne povzroči listne reakcije ali zmanjša pridelek.

Fungicidi

Proti krompirjevi plesni je potrebna dosledna preventivna zaščita.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne, ker je občutljiv na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Čas skladiščenja

Primeren za dolgo skladiščenje. Priporočena temperatura skladiščenja je 5 °C. Za predelavo temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7 °C.



www.interseme.si/izdelek/krompir-prince

Interseme je opise sort pripravil z vso skrbnostjo in po svojih najboljših močeh zagotovil dejanske in resnične opise sort. Upoštevajte možnost, da se informacije lahko spremenijo. Interseme ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti. Interseme v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki izhaja iz ali je lahko povezana z informacijami iz teh opisov.

Tržaška cesta 202
1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22
F +386 1 256 57 24
www.interseme.si

interseme