

# Agata.

TRŽNI NAMEN



Zgodnja jedilna sorta, primerna za kuhanje, s privlačno gladko rumeno kožico, daje velike pridelke.

- ▶ Izenačena oblika in velikost gomoljev
- ▶ Odporna na virusne bolezni
- ▶ Odporna proti mehanskim poškodbam

## Splošni podatki

Žlahtnitelj: Lantmännen Seed B.V.

Križanec: BM 72-0052 x SIRCO

Sejanec: GE 77-0134

Žlahtniteljske pravice: Potekla



## LASTNOSTI

### Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje veliko / 5

Listi - začetni razvoj: zelo hiter / 8

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: ovalni

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: zelo veliko / 8

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6

### Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): zelo kratka / 4

Metribuzin - pred vznikom: nekoliko občutljiv / 6

Metribuzin - po vzniku: nekoliko občutljiv / 6

Bentazon: - / -

Ethylene: 5% manj do 5% več gomoljev / 5

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): malo občutljiv / 7

Podvodna teža: 316

Vsebnost suhe snovi: 17,6%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6,5

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6



# VZGOJA

[www.interseme.si/izdelek/krompir-agata](http://www.interseme.si/izdelek/krompir-agata)

## Gnojenje<sup>1</sup>

**Dušik:** standardni odmerek + 20%. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

**Fosfor:** standardni odmerek.

**Kalij:** standardni odmerek.

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kalčkov je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kalčkov (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

## Sadilna razdalja

28/35 mm: 20 cm (67.000 rastlin/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 rastlin/ha)

## Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

## Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

## Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za dolgo skladiščenje.



## Odpornost na bolezni in škodljivce

**Nematode Ro 1/4:** odporen / 9

**Nematode Ro 2/3:** - / -

**Nematode Pa 2:** - / -

**Nematode Pa 3:** - / -

**Plesen na listih:** občutljiv / 5

**Plesen na gomoljih:** malo občutljiv / 6

**Krastavost:** občutljiv / 5

**Prašnata krastavost:** malo občutljiv / 6

**Fuzarioze:** občutljiv / 5

**Črna pikavost gomoljev:** malo občutljiv / 6,5

**Tobakov mozaik:** malo občutljiv / 6,5

**Virus zvijanja listov:** malo občutljiv / 6

**Virus - A:** - / -

**Virus - Yn:** malo občutljiv / 7

**Virus - Yntn (gomolj):** malo do neobčutljiv / 8

**Krompirjev rak 1:** odporen / 10

**Krompirjev rak 6:** - / -

**Krompirjev rak 18:** - / -