

Agria.

TRŽNI NAMEN



Pozna, rumeno mesnata sorta, ki daje velike pridelke in zanesljivo kvaliteto.

- » Nizka vsebnost sladkorjev, pri cvrtju se tvori manj akrilamida
- » Popolnoma odporna na viruse
- » Dobro se skladišči


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Böhm

Križanec: QUARTA x SEMLO

Sejanec: BM 77-0945

Žlahtniteljske pravice: Potekla



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: pozna / 5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: nič / 8

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: rumena / 7

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: srednje dobra / 6

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): zelo dolga / 8

Metribuzin - pred vznikom: malo občutljiv / 7,5

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7,5

Bentazon: nekoliko občutljiv / 6,5

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): občutljiv / 5

Podvodna teža: 402

Vsebnost suhe snovi: 21,8%

Uporabnost za čips: dober / 7

Uporabnost za cvrtje: odličen / 8

Kuharski tip: moknat / BC

Sprememba barve po lupljenju: malo občutljiv / 7

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-agria

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek - 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravičen odmerek gnojil.

Priprava semena

Priporočljiv je kratek temperaturni šok ali ustrezna nakalitev. Odstranjevanje apikalnih kalčkov je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 rastlin/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Priporočljiva je preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo tri tedne, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Za predelavo, temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7°C. Primeren za dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: občutljiv / 2

Nematode Pa 3: občutljiv / 2

Plesen na listih: občutljiv / 5,5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 7

Krastavost: zelo občutljiv / 4,5

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 3

Fuzarioze: malo občutljiv / 6,5

Črna pikavost gomoljev: - / -

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 7

Virus zvijanja listov: malo občutljiv / 6

Virus - A: malo do neobčutljiv / 9

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: malo občutljiv / 9

Krompirjev rak 6: občutljiv / 6

Krompirjev rak 18: - / -