

Alouette.

TRŽNI NAMEN

Prihodnja
Generacija

Srednje pozna sorta z rdečo kožico, odporna na plesen tako na listih kot tudi na gomoljih, primerna za konvencionalno in ekološko pridelavo.

- ▶ Odporna proti črnenju gomoljev
- ▶ Vsestransko uporabna
- ▶ Dobro prenaša sušo

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: AR 02-139-1 x LAURA

Sejanec: AR 04-3153

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2044



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 6

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: zelo hiter / 8

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7,5

Barva mesa: rumena / 7,5

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: izenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: malo občutljiv / 7,5

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% manj gomoljev / 4

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 389

Vsebnost suhe snovi: 21,1%

Uporabnost za čips: - / -

Uporabnost za cvrtje: primeren / 6,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: malo občutljiv / 7

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-alouette

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 20%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Začetni razvoj te sorte je počasen, zato moramo saditi v ogreto zemljo. Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 20 cm (67.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Kljub odpornosti na krompirjevo plesen, bodite pozorni na okužbe.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Za predelavo, temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: odporen na polju / 8

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: malo do neobčutljiv / 9

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 9

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6,5

Fuzarioze: malo občutljiv / 7,5

Črna pikavost gomoljev: - / -

Tobakov mozaik: občutljiv / 5,5

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -