

Anais.

TRŽNI NAMEN



Zelo zgodnja in okusna jedilna sorta, ki daje velike pridelke.

- ▶ Zelo hitro polni gomolje
- ▶ Dobro prenaša sušo
- ▶ Primerna za vzgojo v zaščitnem prostoru

Splošni podatki

Žlahtnitelj: G.R.O.C.E.P

Križanec: MONALISA x LIZEN

Sejanec: -

Žlahtniteljske pravice:



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: malo / 4,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: srednje dober / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: okroglo ovalni

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): kratka / 5

Metribuzin - pred vznikom: malo občutljiv / 7

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7

Bentazon: - / -

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 325

Vsebnost suhe snovi: 18

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6,5

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-anais

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Enkratna nakalitev daje optimalne rezultate.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 27 cm (49.400 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.400 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina po vzniku lahko povzroči manjše razbarvanje listov, vendar bistveno ne zmanjša pridelka.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Priporočljiva je preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.

Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: - / -

Nematode Ro 2/3: - / -

Plesen na listih: malo občutljiv / 6

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 8

Krastavost: malo občutljiv / 7

Prašnata krastavost: - / -

Fuzarioze: - / -

Črna pikavost gomoljev: - / -

Tobakov mozaik: - / -

Virus zvijanja listov: malo občutljiv / 7

Virus - Yn: občutljiv / 5

Virus - Yntn (gomolj): - / -