

Arrow.

TRŽNI NAMEN



Zelo zgodnja jedilna sorta s privlačno gladko kožico, primerna za pridelavo v različnih tipih tal.

- ▶ Krem bela barva mesa
- ▶ Ovalno podolgovati gomolji
- ▶ Dobro prenaša sušo


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: SOLARA x FRESCO

Sejanec: AR 93-0084

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2034



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: srednje hiter / 6,5

Listi - končni razvoj: srednje dobra / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6

Barva mesa: krem bela / 5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: izenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): kratka / 5

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5

Bentazon: - / -

Ethylene: 15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 355

Vsebnost suhe snovi: 19,5%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-arrow

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 20 cm (67.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina pred ali po vzniku lahko povzroči negativen učinek na pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 4

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 7

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: občutljiv / 5

Fuzarioze: občutljiv / 5

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: občutljiv / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7,5

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -