

Artemis.

TRŽNI NAMEN



Dobra izbira

Srednje zgodnja sorta, ki daje velike pridelke in je odlična za pripravo ocvrtega krompirja.

- ▶ Odlična za cvrtje
- ▶ Odporna na mehanske poškodbe in črnenje gomoljev
- ▶ Odporna na nematode, krompirjev rak in plesen na gomoljih


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: Rianta x Renska

Sejanec: AR 87-0039

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2029



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje zgodnja / 7

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: srednje dobra / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: veliko / 7

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): kratka / 5,5

Metribuzin - pred vznikom: nekoliko občutljiv / 6

Metribuzin - po vzniku: nekoliko občutljiv / 6

Bentazon: - / -

Ethylene: - / -

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6,5

Podvodna teža: 375

Vsebnost suhe snovi: 20,4%

Uporabnost za čips: srednje primeren / 6

Uporabnost za cvrtje: srednje primeren / 6

Kuharski tip: moknat / B

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-artemis

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Začetni razvoj te sorte je počasen, zato moramo saditi v ogreto zemljo. Odstranjevanje apikalnih kalčkov je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 27 cm (50.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Za predelavo, temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 8

Krastavost: občutljiv / 5,5

Prašnata krastavost: občutljiv / 5,5

Fuzarioze: občutljiv / 5

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: malo občutljiv / 7

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo občutljiv / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): malo do neobčutljiv / 8

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -