

Constance.

TRŽNI NAMEN



Srednje zgodnja sorta z lepo rumeno kožico in svetlo rumenim mesom.

- ▶ Enostavna za pridelavo
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje
- ▶ Odporna na sekundarno rast in pokanje gomoljev

Splošni podatki

Žlahtnitelj: J.L. Spijckman

Križanec: MARABEL x AR 93-1243

Sejanec: SA 02-0020

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2044



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje zgodnja / 7

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje / 6

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6,5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: ovalno okrogli

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6,5

Metribuzin - pred vzniku: malo občutljiv / 7

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7,5

Bentazon: malo do neobčutljiv / 8

Ethylene: 15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast: malo občutljiv / 7

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): zelo občutljiv / 4,5

Podvodna teža: 358

Vsebnost suhe snovi: 19,7%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6,5

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-constance

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 15%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 15%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 27 cm (50.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 36 cm (37.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo tri tedne, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: - / -

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: zelo občutljiv / 4,5

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 3

Fuzarioze: malo občutljiv / 6,5

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 6,5

Krompirjev rak 1: - / -

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -