

Desiree.

TRŽNI NAMEN



Dobra izbira


Srednje pozna sorta, z rdečo kožico, ki daje dobre pridelke.

- ▶ Vsestranska uporaba
- ▶ Odporna na krompirjev rak
- ▶ Dobro se skladišči

Splošni podatki

Žlahtnitelj: ZPC

Križanec: URGENTA x DEPESCHE



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: srednje / 6

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo slab / 6

Listi - trdnost: čvrst / 7,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7,5

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: veliko / 7

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: malo do neobčutljiv / 8

Metribuzin - po vzniku: malo do neobčutljiv / 8

Bentazon: - / -

Ethylene: - / -

Ponovna rast: malo občutljiv / 7

Pokanje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Črnenje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6,5

Podvodna teža: 397

Vsebnost suhe snovi: 21,5%

Uporabnost za čips: neprimeren / 5

Uporabnost za cvrtje: primeren / 6,5

Kuharski tip: čvrst / B

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: občutljiv / 5,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-desiree

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 15%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravičen odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 27 cm (50.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: občutljiv / 1

Nematode Ro 2/3: občutljiv / 1

Nematode Pa 2: občutljiv / 1

Nematode Pa 3: občutljiv / 1

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 6

Krastavost: zelo občutljiv / 4,5

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 7

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: - / -

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 7

Virus zvijanja listov: zelo občutljiv / 4,5

Virus - A: malo občutljiv / 7

Virus - Yn: malo občutljiv / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: malo občutljiv / 9

Krompirjev rak 18: - / -