

Elland.

TRŽNI NAMEN



Dobra izbira

Srednje pozna sorta, odporna na krastavost in temperaturne strese.

- ▶ Veliko število izenačenih gomoljev
- ▶ Veliki pridelki
- ▶ Dobro se skladišči

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Cygnet PB Ltd

Križanec: GOLDEN MILLENIUM x INNOVATOR

Sejanec: -

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2050



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: veliko / 4,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: srednje dobra / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: srednje slaba / 5

Velikost gomoljev: veliki / 7,5

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: veliko / 7

Izenačenost gomoljev: izenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5

Bentazon: - / -

Ethylene: - / -

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): malo občutljiv / 7

Podvodna teža: 377

Vsebnost suhe snovi: 20,5%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4,5

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: moknat / BC

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-elland

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 rastlin/ha)

Varstvo pred plevlji

Uporaba metribuzina pred ali po vzniku lahko povzroči negativen učinek na pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.

Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: občutljiv / 3

Nematode Ro 2/3: občutljiv / 3

Nematode Pa 2: odporen / 9

Nematode Pa 3: odporen na polju / 8

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: zelo občutljiv / 4

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 4

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 6

Tobakov mozaik: občutljiv / 5

Virus zvijanja listov: občutljiv / 5

Virus - A: - / -

Virus - Yn: zelo občutljiv / 3

Virus - Yntn (gomolj): občutljiv / 5

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -