

# Esmee.

TRŽNI NAMEN



Srednje zgodnja sorta z lepo rdečo kožico, odporna je na temperaturne strese in daje velike pridelke.

- ▶ Zelo lep izgled
- ▶ Odličnega okusa
- ▶ Odporna na viruse


## Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: LAURA x RODEO

Sejanec: AR 01-0410

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2043



## LASTNOSTI

### Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje zgodnja / 6,5

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: dobra / 7,5

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: rumena / 7

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

### Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: zelo občutljiv / 4

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% manj do 5% več gomoljev / 5

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6,5

Podvodna teža: 326

Vsebnost suhe snovi: 18%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: srednje primeren / 6

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6

Sprememba barve po kuhanju: občutljiv / 5,5



# VZGOJA

[www.interseme.si/izdelek/krompir-esmee](http://www.interseme.si/izdelek/krompir-esmee)

## Gnojenje<sup>1</sup>

**Dušik:** standardni odmerek + 10%.

**Fosfor:** standardni odmerek.

**Kalij:** standardni odmerek.

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravičen odmerek gnojil.

## Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

## Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 rastlin/ha)

## Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

## Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

## Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



## Odpornost na bolezni in škodljivce

**Nematode Ro 1/4:** - / -

**Nematode Ro 2/3:** - / -

**Nematode Pa 2:** - / -

**Nematode Pa 3:** - / -

**Plesen na listih:** zelo občutljiv / 4,5

**Plesen na gomoljih:** malo občutljiv / 7

**Krastavost:** malo občutljiv / 6

**Prašnata krastavost:** malo občutljiv / 6,5

**Fuzarioze:** malo občutljiv / 7

**Črna pikavost gomoljev:** občutljiv / 5,5

**Tobakov mozaik:** zelo občutljiv / 4

**Virus zvijanja listov:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - Yn:** malo do neobčutljiv / 8

**Virus - Yntn (gomolj):** malo občutljiv / 7

**Krompirjev rak 1:** odporen / 10

**Krompirjev rak 6:** - / -

**Krompirjev rak 18:** - / -