

Jolene.

Srednje pozna sorta z dobro utrjeno kožico in odličnimi kulinarnimi lastnostmi.

- ▶ Svetlo rumeno meso
- ▶ Odlična za pripravo ocvrtega krompirja
- ▶ Dobra vsebnost suhe snovi


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: SAGITTA x AR 03-1491

Sejanec: AR 09-2556

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2050



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 6

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje malo / 7

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7,5

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: veliko / 7

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: nekoliko občutljiv / 6,5

Metribuzin - po vzniku: malo do neobčutljiv / 8

Bentazon: - / -

Ethylene: 15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast: malo občutljiv / 7

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 389

Vsebnost suhe snovi: 21,1%

Uporabnost za čips: neprimeren / 5

Uporabnost za cvrtje: dober / 7

Kuharski tip: čvrst / B

Sprememba barve po lupljenju: malo občutljiv / 7

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-jolene

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: - / -

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 4

Plesen na gomoljih: občutljiv / 5

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6,5

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo do neobčutljiv / 8

Krompirjev rak 1: - / -

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -