

# Kresnik.

TRŽNI NAMEN



Zelo zgodnja tradicionalna slovenska sorta, za pridelavo okusnega mladega krompirja.

- ▶ Odlična za pečenje in solate
- ▶ Številni podolgovati gomolji v obliki kifeljca
- ▶ Odporna na sekundarno rast in pokanje gomoljev

## Splošni podatki

Žlahtnitelj: KIS

Križanec: JANA X ANOKA



## LASTNOSTI

### Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8,5

Barva cveta: vijolična

Tvorba jagod: srednje / 6

Listi - začetni razvoj: srednje hiter / 6

Listi - končni razvoj: srednje dobra / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6,5

Barva mesa: bela / 4

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: srednji / 6

Oblika gomolja: podolgovati

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: zelo veliko / 8

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6

### Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): zelo kratka / 4

Metribuzin - pred vznikom: malo občutljiv / 7

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7

Bentazon: - / -

Ethylene: - / -

Ponovna rast: - / -

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): občutljiv / 5

Podvodna teža: 400

Vsebnost suhe snovi: 22%

Uporabnost za čips: neprimeren / 5

Uporabnost za cvrtje: dober / 7

Kuharski tip: zelo čvrst / A

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



# VZGOJA

[www.interseme.si/izdelek/krompir-kresnik](http://www.interseme.si/izdelek/krompir-kresnik)

## Gnojenje<sup>1</sup>

**Dušik:** standardni odmerek.

**Fosfor:** standardni odmerek.

**Kalij:** standardni odmerek.

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravičen odmerek gnojil.

## Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

## Sadilna razdalja

28/35 mm: 20 cm (66.500 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 plants/ha)

## Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

## Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

## Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje.



## Odpornost na bolezni in škodljivce

**Nematode Ro 1/4:** občutljiv / 2

**Nematode Ro 2/3:** občutljiv / 2

**Nematode Pa 2:** občutljiv / 2

**Nematode Pa 3:** občutljiv / 2

**Plesen na listih:** malo občutljiv / 6

**Plesen na gomoljih:** občutljiv / 5

**Krastavost:** malo občutljiv / 7

**Prašnata krastavost:** malo občutljiv / 6,5

**Fuzarioze:** - / -

**Črna pikavost gomoljev:** malo občutljiv / 6

**Tobakov mozaik:** malo do neobčutljiv / 8

**Virus zvijanja listov:** malo občutljiv / 7

**Virus - A:** - / -

**Virus - Yn:** občutljiv / 5,5

**Virus - Yntn (gomolj):** občutljiv / 5

**Krompirjev rak 1:** odporen / 10

**Krompirjev rak 6:** - / -

**Krompirjev rak 18:** - / -