

Levante.

TRŽNI NAMEN

Prihodnja
Generacija

Pozna jedilna sorta z lepo rumeno kožico, odporna na plesen na listih in gomoljih.

- ▶ Veliko število gomoljev
- ▶ Dobro utrjena kožica
- ▶ Dobro se skladišči

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: AR 01-3218 x ALMERA

Sejanec: AR 07-3009

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje veliko / 5,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kožice: rumena

Utrjenost kožice: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: podolgovato ovalni

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: zelo veliko / 8

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6,5

Metribuzin - pred vznikom: nekoliko občutljiv / 6,5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5,5

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% manj gomoljev / 4

Ponovna rast: malo občutljiv / 7

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 365

Vsebnost suhe snovi: 19,9%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4,5

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: čvrst / B

Sprememba barve po lupljenju: občutljiv / 5,5

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-levante

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Začetni razvoj te sorte je počasen, zato moramo saditi v ogreto zemljo. Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev. Priporočljiv je kratek temperaturni šok ali ustrezna nakalitev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina pred ali po vzniku lahko povzroči negativen učinek na pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Kljub odpornosti na krompirjevo plesen, bodite pozorni na okužbe.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: malo do neobčutljiv / 8,5

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 7,5

Krastavost: občutljiv / 5

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6,5

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Tobakov mozaik: zelo občutljiv / 4,5

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo občutljiv / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo do neobčutljiv / 8,5

Krompirjev rak 1: - / -

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -