

Manitou.

TRŽNI NAMEN



Okusno

Pozna jedilna sorta s privlačno rdečo kožico in velikimi pridelki.

- ▶ Odlična za praženje
- ▶ Dobro prenaša temperaturne strese
- ▶ Odporna na krastavost in nematode

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Križanec: LAURA x MARANCA

Sejanec: MA 96-0419

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2037



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: pozna / 5

Barva cveta: lila

Tvorba jagod: srednje veliko / 5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: podolgovato ovalni

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: veliko / 7

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): kratka / 5,5

Metribuzin - pred vznikom: zelo občutljiv / 4

Metribuzin - po vzniku: zelo občutljiv / 3,5

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): občutljiv / 5,5

Podvodna teža: 351

Vsebnost suhe snovi: 19,4%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4,5

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: čvrst / B

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-manitou

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 rastlin/ha)

Varstvo pred plevlji

Uporaba metribuzina pred ali po vzniku povzroči negativen učinek na pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: odporen / 9

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 6

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6

Fuzarioze: malo občutljiv / 7

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 7

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo občutljiv / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -