

# Paradiso.

Srednje pozna sorta, z velikimi podolgovatimi gomolji in velikim pridelkom.

- ▶ Svetlo rumeno meso
- ▶ Čudovit izgled in utrjena kožica
- ▶ Ni občutljiva na mehanske poškodbe


## Splošni podatki

Žlahtnitelj: M. Pot & M. Klaver

Križanec: RODEO x VALOR

Sejanec: PK 06-0108

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048



## LASTNOSTI

### Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: vijolična

Tvorba jagod: srednje malo / 6,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: dobra / 7,5

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kožice: rumena

Utrjenost kožice: dobra / 7

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: izenačeni / 6,5

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: izenačeni / 6,5

### Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: malo do neobčutljiv / 8

Metribuzin - po vzniku: nekoliko občutljiv / 6,5

Bentazon: nekoliko občutljiv / 6,5

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: malo občutljiv / 7

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6,5

Podvodna teža: 329

Vsebnost suhe snovi: 18,2

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4,5

Kuharski tip: čvrst / B

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



# VZGOJA

[www.interseme.si/izdelek/krompir-paradiso](http://www.interseme.si/izdelek/krompir-paradiso)

## Gnojenje<sup>1</sup>

**Dušik:** standardni odmerek - 20%. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

**Fosfor:** standardni odmerek.

**Kalij:** standardni odmerek.

<sup>1</sup> Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

## Priprava semena

Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

## Sadilna razdalja

28/35 mm: 22-24 cm (55.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 32-35 cm (40.000 rastlin/ha)

## Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina po vzniku ne bo povzročila listne reakcije ali zmanjšala pridelek.

## Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

## Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

## Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



## Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5,5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 6,5

Krastavost: občutljiv / 5,5

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 7,5

Fuzarioze: občutljiv / 5

Črna pikavost gomoljev: občutljiv / 5,5

Tobakov mozaik: zelo občutljiv / 4

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo občutljiv / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7,5

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -