

Ranomi.

TRŽNI NAMEN



Zgodnja sorta, odporna na krastavost, ki daje velike zgodnje pridelke.

- ▶ Lepa in gladka kožica
- ▶ Veliki gomolji
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: AR 93-033-79 x AR 95-0319

Sejanec: AR 03-0221

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2044



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zgodnja / 7,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje / 6

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: srednje dobra / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6,5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: nekoliko občutljiv / 6

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 322

Vsebnost suhe snovi: 17,9%

Uporabnost za čips: neprimeren / 5

Uporabnost za cvrtje: primeren / 6,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-ranomi

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je sorta občutljiva na črnenje gomoljev in mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 4

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 6

Krastavost: malo občutljiv / 6,5

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 4,5

Fuzarioze: občutljiv / 5

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6,5

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: občutljiv / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 6

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -