

Riviera.

TRŽNI NAMEN



Zelo zgodnja jedilna sorta s privlačno kožico, odlično prenaša temperaturne strese, odporna je na viruse, daje dober zgoden pridelek.

- ▶ Veliki gomolji
- ▶ Zelo lep izgled
- ▶ Odporna na viruse

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Mts. Boerhave

Križanec: MINERVA x ALCMARIA

Sejanec: BH 86-0266

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2030



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: srednje dobra / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: veliki / 7,5

Oblika gomolja: ovalno okrogli

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: malo do neobčutljiv / 8

Metribuzin - po vzniku: malo do neobčutljiv / 8

Bentazon: - / -

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 318

Vsebnost suhe snovi: 17,7%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: občutljiv / 5,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-riviera

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 3

Plesen na gomoljih: občutljiv / 5

Krastavost: občutljiv / 5,5

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 2

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: občutljiv / 5,5

Tobakov mozaik: zelo občutljiv / 4

Virus zvijanja listov: malo občutljiv / 7

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -