

Rudolph.

TRŽNI NAMEN



Dobra izbira

Srednje pozna sorta s privlačno rdečo kožico, dobro prenaša temperaturne strese in daje velike pridelke.

- ▶ Belo meso
- ▶ Veliki gomolji
- ▶ Dobro se skladišči

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: CHIEFTAIN x STIRLING

Sejanec: UK 93-1-2

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2035



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: srednje / 6

Listi - začetni razvoj: srednje hiter / 6

Listi - končni razvoj: zelo dobra / 8

Listi - trdnost: zelo čvrst / 8

Barva mesa: bela / 4

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno okrogli

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): dolga / 7,5

Metribuzin - pred vznikom: malo do neobčutljiv / 8

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7,5

Bentazon: - / -

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 376

Vsebnost suhe snovi: 20,5%

Uporabnost za čips: malo primeren / 5,5

Uporabnost za cvrtje: primeren / 6,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-rudolph

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 5%. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Priporočljiv je kratek temperaturni šok ali ustrezna nakalitev. Odstranjevanje apikalnih kalčkov je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Enkratna nakalitev daje optimalne rezultate.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 rastlin/ha)

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Za predelavo, temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7°C. Primeren za dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: - / -

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5,5

Plesen na gomoljih: občutljiv / 5,5

Krastavost: občutljiv / 5

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 7

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 7

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: občutljiv / 5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: srednje občutljiv / 8

Krompirjev rak 18: - / -