

Twister.

TRŽNI NAMEN

Prihodnja
Generacija

Srednje zgodnja sorta, primerna za ekološko pridelavo, ki daje dobre pridelke in je odporna na plesen na listih in gomoljih.

- ▶ Zelo lep izgled
- ▶ Dobro se skladišči
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje

Splošni podatki

Žlahtnitelj: G.W. te Winkel

Križanec: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Sejanec: TW 08-1507

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje zgodnja / 7

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: srednje veliko / 5,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: dobra / 7,5

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6,5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: okroglo ovalni

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: izenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): dolga / 7

Metribuzin - pred vznikom: zelo občutljiv / 3

Metribuzin - po vzniku: zelo občutljiv / 3

Bentazon: nekoliko občutljiv / 6

Ethylene: 5% manj gomoljev / 4

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): malo občutljiv / 7

Podvodna teža: 345

Vsebnost suhe snovi: 19%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



VZGOJA

www.interseme.si/izdelek/krompir-twister

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 20%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Enkratna nakalitev daje optimalne rezultate.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred plevlji

Uporaba metribuzina pred ali po vzniku povzroči negativen učinek na pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Kljub odpornosti na krompirjevo plesen, bodite pozorni na okužbe.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja je 6°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: malo do neobčutljiv / 9

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 9

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: občutljiv / 5

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - A: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo do neobčutljiv / 8

Krompirjev rak 1: srednje občutljiv / 8

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -